



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HIVATALOS VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS
2026/II.

A VÉDEKEZÉS ELVÉGZÉSE MINDEN TERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!

1. INDOKLÁS

Az amerikai szőlőkabóca imágóinak megjelenése 2026.07.16 megkezdődött. A kártevő terjeszti a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó (FD) fitoplazmát, mely betegség gyógyíthatatlan. A védekezés célja a térségi védekezések összehangolásával a járvány megfékezése.

Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el: <https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A védekezés elmulasztása növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

3. HATÁRIDŐK ÉS ÜTEMEZÉS

Stádium	Optimális időpont	Művelet
Imágó	2026.08.01-2026.08.15	Permetezés

4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes lista az 1. sz. mellékletben vagy az alábbi linken:

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf>

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 30. §-a szerinti nyilvántartás vezetésére kötelezett termelőknek a kezelést a permetezési naplóban a munkavégzést követő 24 órán belül kell rögzíteniük.

Jelen esetben ajánlott a növényvédelmi kezelés elvégzését a elektronikus felületen is rögzíteni 48 órán belül a vissza ellenőrizhetőség érdekében.

5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- **Permetlé fedettsége:** Ügyeljen a teljes lombfelület és a levelek fonákának megfelelő permetborítására.
- **Nagyobb, egybefüggő területen** (adott kistájon vagy dűlőkben összehangoltan) **egy időben végzett kezelés a permetezések hatékonyságát növeli.**
- **Szerfelhasználás:** Javasolt legalább egy alkalommal felszívódó készítményt alkalmazni a tartós hatás érdekében.
- Bővebb információ és technológiai segédlet:

KONVENCIONÁLIS

Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása

ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS

Az aranyszínű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

6. HATÓSÁGI SZEMÉLYEK ÉS HEGBÍRÓK ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal a hatósághoz vagy a hegybíróhoz:

Prohászka Péter, növényvédelmi felügyelő; tel.: +36-70-1987-466

Tóth Zsuzsanna, növényvédelmi felügyelő; tel.: +36-30-916-9801

Kószás Kornél, növényvédelmi felügyelő; tel.: +36-20-569-3374

Vörös Gergő, növényvédelmi felügyelő; tel.: +36-70-1987-467

Horváth Mihály, hegybíró; tel.: +36-70-489-8692

Simecz Róbert, hegybíró; tel.: +36-70-489-8738

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2026. évre vonatkozó második védekezési felhívást teszi közzé a Neszmélyi borvidék összes szőlő területén elvégzendő 3.. az imágók ellen célzott kötelező védekezés vonatkozásában:

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2026. évben is folyamatosan vizsgálja a hazai szőlő területeken az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) egyedfejlődését és egyedszámának alakulását. A szőlőkabóca L1-L2 stádiumú lárváinak tömeges jelenléte utoljára június közepén fordult elő, az utolsók észlelése július első napjaiban történt. 2026. június vége óta L2-L3 stádiumú lárvákat sem észleltünk nagy tömegben, az L3 stádium utolsó észlelései július 10-e körül voltak. Az L4-L5 lárvastádiumok észlelése sporadikus és alacsony egyedszámú, mely megszokott jelenség, ezek a fejlődési alakok elsősorban hálózással lennének észlelhetők. Az első imágó megjelenésére vármegyénkben 2026. július 16-án került sor. **A megfigyelések alapján augusztus első napjaira várhatóan már az összes egyed teljesen kifejlődik repülésre is képes imágóvá.** A korábbi évek hasonló időszakához képest az imágók megjelenése egy héttel későbbre tolódott, és az eredményes védekezéseknek is köszönhetően mind a lárvák, mind az imágók egyedszáma lényegesen alacsonyabb. A felhagyott ültetvényekhez és erdős területekhez közeli ültetvényrészek fokozott kockázatnak vannak kitéve, és ide a kabócák betelepülése még az eddig alkalmazott eredményes védekezés ellenére is nagy egyedszámban történhet meg a következő hetekben.

A vizsgálatok eredményei alapján, ezért **a harmadik kötelező védekezést augusztus első felében, de legkésőbb augusztus 15. napjáig szükséges elvégezni valamennyi szőlőtermő területen.** Amennyiben az ültetvényben végzett megfigyelések alapján a kabócák egyedszáma eléri a védekezési küszöböt, ez az időpont előbbre is hozható, vagy ha nem éri el a védekezési küszöb értéket, úgy ez az időpont későbbre is tolódhat, de a tenyészidőszakban legalább egy alkalommal minden ültetvényben védekezni kell az imágók ellen. A tervezett szüret időpontját és az élelmezés-egészségügyi várakozási időt az alkalmazandó növényvédő szer kiválasztásánál figyelembe kell venni.

Az ökológiai ültetvényekben a védekezést a várhatóan nagyobb egyedszám miatt már a megadott periódus elején ajánlott végrehajtani.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagában nem elegendő, a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése válhat indokolttá. Ezért elengedhetetlen a kártevő népességének a megfigyelése. A szaporítóanyag előállító területeken legalább 3 színcsapdát (sárga ragacslap) kell kihelyezni hektáronként. Termő ültetvényekben az ajánlott sűrűség 5 ha-os táblaméretig 3 csapda/ha, 5–10 ha összefüggő táblaméretig 2 csapda/ha, és 10 ha feletti összefüggő táblaméret esetén 30 csapda/ültetvény. Hetente egy alkalommal szükséges a csapdafogást leolvasni, illetve a lombozaton az imágók jelenlétét megfigyelni. A fogások alapján alacsony a kifejlett alakok populációsűrűsége, ha a fogott egyedek száma átlagosan 4 egyed/csapda/10 nap, közepes, amennyiben 4–15 egyed/csapda/10 nap a fogás és magas, ha a csapdázott imágók száma nagyobb, mint 15 egyed/csapda/10 nap.

Fontos, hogy a fitoplazmát terjesztő **amerikai szőlőkabóca repülésre képes imágója át tudja vinni a fertőzött tőkéről egészséges tőkére a kórokozót táblán belül és táblák között is.**

Szaporítóanyag-előállító területek

A szaporítóanyag-előállító területeken – ideértve a törzsültetvényeket és faiskolákat – a védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy az adott területen észleltek-e kabócát.

Alkalmazható készítmények és technológiák

A védekezésre a felhívás 1. sz. mellékletének (Nébih honlapján elérhető Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek) táblázatában szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Az ökológiai szőlőültetvények esetében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által elkészített védekezési technológia itt érhető el.

A konvencionális szőlőültetvények esetében a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által elkészített védekezési technológia itt érhető el.

Lényeges, hogy a kezelések során olyan növényvédő szereket használjon a szőlőtermelő, amelyek a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezettek, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia (lásd 1. sz. melléklet) pedig nem zárja ki a kifejezett alak elleni alkalmazásukat.

Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása csak a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adattalappal lehetséges.

Rezisztenciakezelés és technológiai tervezés

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a termelők figyelmét arra, hogy az integrált növényvédelem alapelveinek betartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rezisztencia kialakulásának megelőzésére.

Ennek érdekében:

- a készítmények engedélyokiratában meghatározott maximális kezelésszámot tilos túllépni.
- a hatóanyagok kiválasztását (rotációját) és alkalmazását tudatosan kell megtervezni,
- valamint a későbbi kezelésekhez olyan készítményeket kell tartalékolni, amelyek az adott fenológiai állapotban még kijuttathatók és élelmezés-egészségügyi várakozási idejük is betartható.

AKG és ÖKO támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettség

A szőlő arany színű sárgaság terjedésének megakadályozása érdekében:

- a KAP-RD19a-1-24 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések” (AKG),
- valamint a KAP-RD20a-1-24 kódszámú „Ökológiai gazdálkodás támogatása” (ÖKO)

pályázati felhívások keretében támogatott szőlőültetvényekben évente legalább két alkalommal kötelező növényvédőszeres védekezést végezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara vizsgálata szerint, a szőlő arany színű sárgaság betegség tipikus tünetei az idei évben már 2026. június végén megjelentek. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a bogyók töppedése is megindult. **A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények**

azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére.

A hatékony védekezés feltétele, hogy valamennyi szőlőterületen - ideértve az árutermelő ültetvényeket és a házikerti szőlőket is - védekezzenek a hatósági felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztessen a szomszédos termelők növényvédelmi, növényegészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

A növényvédőszeres védekezéshez felhasználható készítmények listáját a felhívás *I. sz. melléklete* (Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek) tartalmazza.

Tata, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban.

dr. Tyukodi Dávid főispán nevében és megbízásából,

Molnár József
osztályvezető

Kapják:

1. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete (kem.novkamara@gmail.com)
2. Neszmélyi Borvidék Hegyközsége (mbhegykozseg@gmail.com)
3. Horváth Mihály hegybíró (horvath.mihaly@hnt.hu)
4. Simecz Róbert hegybíró (simecz.robert@hnt.hu)
5. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi Igazgatósága (ni@nebih.gov.hu)
6. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (hnt@hnt.hu)

1. sz. melléklet Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Lezárva: 2026. június 11.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa. Nébih)

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Legkisebb kiszerelés	A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület **	A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus
Agrokén (szőlő, füves területekben is felhasználható)	poliszulfidkén, paraffinolaj, etoxilált zsírsavak	III.	0,25; 0,5; 1; 5; 20; 50 kg; 1 m ³	50 m ²	2	tojás	kontakt
Decis	deltametrin	III.	5 - 3 ml 50 ml	5 - 200 m ² 3333 m ²	2	larva, imágó	kontakt
Decis Forte (származtatott: Detector, Nuyard)	deltametrin	I. II.	≤100 ml 50 ml	1,3 ha 6666 m ²	2	larva, imágó	kontakt
Decis Mega	deltametrin	II.	≤100 ml	666 m ²	3	larva, imágó	kontakt
Exirel (származtatott: Irazu)	ciantraniliprol	I. II.	≤200 ml ≤20 ml	2222 m ² 220 m ²	2	larva	szisztémikus
Karate Zeon 5 CS (származtatott: Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS); (párhuzamos: Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS)	lambda-cihalotrin	II. III.	≤200 ml 2,5; 5; 50 ml	8000 m ² 100 m ²	2	larva, imágó	kontakt
Klartan 24 EW (származtatott: Mavrik 24 EW, Monospel 24 EW)	tau-fluvalinát	I. II.	0,2 l 3 ml	6666 m ² 100 m ²	2	larva, imágó	kontakt
Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Legkisebb kiszerelés	A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület **	A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra)	lambda-cihalotrin	III.	5; 50; 200 g; 1; 5 kg	100 m ²	2	larva, imágó	kontakt

Laser (származtatott: Nexsuba) ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II.	≥500 ml	1,25 ha	2	larva	kontakt
Laser Duplo ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II. III.	≥250 ml 2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml	1,25 ha 100 m ²	2	larva	kontakt
Limocide (származtatott: Limocid) ökológiai termesztésben is felhasználható	narancsolaj	II.	1 l	1 ha	6	lárva, imágó	kontakt
Mospilan 20 SG * (származtatott: Gazelle 20 SG *, Mospilan 20 SG Original *, Rafting *, Spilan 20 SG *); fpárhuzamos: Mospilan SG *)	acetamiprid	I. II. III.	≥1 kg 100 g 4 g	2,6 ha 2666 m ² 106 m ²	1	larva	szisztémikus
Nevikén ökológiai termesztésben is felhasználható	poliszulfidkén. paraffinolaj	III.	0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20; 1000 l	50 m ²	2	tojás	kontakt
Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Legkisebb kiszerelés	A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület **	A kezelések maximális száma egy tenyésztőszakban	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus
Nevikén Extra ökológiai termesztésben is felhasználható	poliszulfidkén. paraffinolaj	III.	0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20; 1000 l	50 m ²	5	tojás	kontakt
Olajos Rézkén ökológiai termesztésben is felhasználható	poliszulfidkén, paraffinolaj, etoxilált zsíralkohol	I. III.	≤5 l 0,25; 0,5; 1 l	830-1560 m ² 42-80 m ²	2	tojás	kontakt
Oraganic ökológiai termesztésben is felhasználható (származtatott: Prev-Gold, Prev Gold Garden, Sinala)	narancsolaj	II. III.	≥1 l 30; 250; 500 ml	1563 m ² 47 m ²	6	lárva, imágó	kontakt
Sanium System (származtatott: Deltam System)	flupiradifuron	II. III.	≥500 ml ≥500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,2 ha 10 m ²	1	larva, imágó	szisztémikus

Sivanto Prime (párhuzamos: Sivanto Prime 200 SL)	flupiradifuron	I. II.	200 l 50 ml	500 ha 1000 m ²	1	larva, imágó	szisztémikus
Sivanto Energy (párhuzamos: Sivanto Energy 85 EC)	deltametrin-flupiradifuron	I.	250 ml	6250 m ²	2	larva, imágó	kontakt és szisztémikus
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	0,25 l	8333 m ²	2	larva, imágó	kontakt
Sumi Alfa 5 EW (származtatott: Sumicidin 5 EW)	eszfenvalerát	I.	5 ml	166 m ²	2	larva, imágó	kontakt
Vegarep EC (származtatott: Dripp Extra, Gravity) ökológiai termeszésben is felhasználható	napraforgó olaj lecitin	III.	0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 20; 1000 l	33 m ²	3	tojás alak	kontakt

* az acetamiprid hatóanyagú készítmények 2025.08.19-től csak szőlő alanytelepen használhatók fel

** dózistartomány esetén a magasabb dózissal számolva

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai szerint történjen.

Szőlőben kabócafajok ellen szükséghelyzeti felhasználásra engedélyezett rovarölő szerek

Lezárva: 2026. április 22.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, Nébih)

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Legkisebb kiszerelés	A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület **	A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Kijuttatási időszak
NeemAzal-T/S ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II. III.	2,5 l 25; 50; 100 ml; 1 l	8333 m ² 83 m ²	2	larva, imágó	nem ismert (IRAC MoA: UN)	2026.05.11.- 2026.09.07.
Aza ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II.	~150 ml	500 m ²	2	larva, imago	nem ismert (IRAC MoA: UN)	2026.05.11.- 2026.09.07.
Pyregard ökológiai termesztésben is felhasználható	piretrin	I.	1 l	1,3 ha	2	larva, imágó	kontakt	2026.03.16.- 2026.07.13.
Carnadine (szarmasztatott: Roslix, Silentium); (parhuzamos: Carnadine, Carnadine 200, Roslix)	acetamiprid	I. II.	~150 ml ≥2 ml	8571 m ² 114 m ²	1	larva	szisztémikus	2026.04.21.- 2026.08.18.

** dózistartomány esetén a magasabb dózissal számolva

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben a szükséghelyzeti engedélyokirat előírásai szerint történjen.